

インフルエンザの定点当たり報告数

インフルエンザは定点把握対象疾患であり、医療機関の中から選定し、協力していただいている定点医療機関からのみ患者数が報告されます。

定点当たり報告数とは、すべての定点医療機関からの報告数を定点数で割った値のことで、言いかえると1医療機関当たりの平均報告数のことです。

厚生労働省・感染症サーベイランス事業により、全国約 5,000 のインフルエンザ定点医療機関を受診した患者数が週ごとに把握されています。長崎県のインフルエンザ定点医療機関は、長崎県内に 70 カ所、長崎市保健所管内に 17 カ所存在します。前述のように、定点当たり報告数とは、このうち1つの医療機関が1週間で何人のインフルエンザ患者を診療したか、を表す数字です。したがって、定点当たり報告数が 3 ならば、1つの医療機関で1週間に 3 人のインフルエンザ患者を診療した、ということになります。

この数字が 1 以上であれば、その地域は流行レベルに入ったことになり、10 以上なら注意報レベル、30 以上なら警報レベルの流行となります。警報が解除されるのはこの数字が「10」を切ってからです。

2016 年は、第 46 週（11/14 - 11/20）の定点当たり報告数が 1.38（患者報告数 6,843 人）となり、2016/2017 年シーズンで初めて全国的な流行開始の指標である 1 を上回りました。**2017 年第 3 週の定点当たり報告数は 28.66**（患者報告数 142,144）と 10 以上で注意報レベルとなり、前週の定点当たり報告数 **15.25** よりも増加しました。

都道府県別では**宮崎県（42.53）**、愛知県（42.46）、埼玉県（38.51）、**大分県（35.60）**、福岡県（**34.29**）、岡山県（34.18）、佐賀県（**32.10**）、山口県（30.75）の順となっており、九州で警報レベルの県が増えております。

国内のインフルエンザウイルスの検出状況を見ると、直近の 5 週間（2016 年第 51 週～2017 年第 3 週）では AH3 亜型の検出割合が最も多く、次いで B 型、AH1pdm09 の順となっています。

(国立感染症研究所HPより抜粋、一部改変)

長崎市、長崎県ともに第47週の報告数は、1未満でしたが、第48週で長崎市(1.0)、長崎県(1.07)ともに1以上となり、流行開始レベルとなりました。

2017年第3週は長崎市(25.82)、長崎県(19.33)で、前週:第2週 長崎市(11.06)、長崎県(9.11)よりも増加しており、長崎市は警報レベルに近い注意報レベル(10以上)となりました。

(長崎県感染症情報センターHPより抜粋、一部改変)

インフルエンザ等の感染予防のために、十分な休息、手洗い、うがい、マスクの着用等を心掛けてください。

インフルエンザが疑われる症状として、のどの痛みや鼻汁・鼻づまり、発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、全身のだるさ等がみられましたら、早めに医療機関を受診してください。

