

インフルエンザの定点当たり報告数

インフルエンザは定点把握対象疾患であり、医療機関の中から選定し、協力していただいている定点医療機関からのみ患者数が報告されます。

定点当たり報告数とは、すべての定点医療機関からの報告数を定点数で割った値のことで、言いかえると1医療機関当たりの平均報告数のことです。

厚生労働省・感染症サーベイランス事業により、全国約 5,000 のインフルエンザ定点医療機関を受診した患者数が週ごとに把握されています。長崎県のインフルエンザ定点医療機関は、長崎県内に 70 カ所、長崎市保健所管内に 17 カ所存在します。前述のように、定点当たり報告数とは、このうち1つの医療機関が1週間で何人のインフルエンザ患者を診療したか、を表す数字です。したがって、定点当たり報告数が 3 ならば、1つの医療機関で1週間に 3 人のインフルエンザ患者を診療した、ということになります。

この数字が 1 以上であれば、その地域は流行レベルに入ったことになり、10 以上なら注意報レベル、30 以上なら警報レベルの流行となります。警報が解除されるのはこの数字が「10」を切ってからです。

2016 年は、**第 46 週**（11/14 - 11/20）の定点当たり報告数が **1.38**（患者報告数 6,843 人）となり、2016/2017 年シーズンで初めて全国的な流行開始の指標である 1 を上回りました。

2017 年**第 22 週**（5/29-6/4）の全国の定点当たり報告数は **0.42**（患者報告数 2,100）で、**前週の定点当たり報告数 0.68**（10 未満）よりも**減少**し、流行レベルの指標 1 を切りました。今シーズンの流行は 20 週までということになります。国立感染症研究所の報告は、22 週（5/29-6/4）で終了となりました。**全国的には、第 4 週（1/25-1/31）が流行のピーク**と考えられました。

2017-2018 シーズンの公表が、第 45 週から開始されました。**2017 年第 45 週**（11/6-11/12）の定点当たり報告数は **0.52**（患者報告数 2,588）となり、**第 44 週**（10/30-11/5）の定点当たり報告数 **0.49** よりも増加しました。

都道府県別では沖縄県（3.78）、**長崎県（1.94）**、福井県（1.84）、宮崎県（1.19）、大分県（1.07）、新潟県（1.06）、福岡県（1.06）、宮城県（1.01）、鹿児島県（0.98）、長野県（0.90）の順となっています。国内のインフルエンザウイルスの検出状況をみると、直近の 5 週間（2017 年第 41～45 週）では AH3 亜型、B 型、AH1pdm09 の順に多いようです。

詳細は国立感染症研究所ホームページ

（<http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html>）を参照して下さい。

長崎市、長崎県ともに第 47 週の報告数は、1 未満でしたが、**第 48 週で長崎市（1.0）、長崎県（1.07）ともに 1 以上となり、流行開始レベル**となりました。

2017 年第 45 週（11/6-11/12）は長崎市（0.35）、長崎県（1.94）でした。**第 44 週（10/30-11/5）の長崎市（0.24）、長崎県（1.89）と比較**しますと、**40 週は長崎市は明らかに増加し流行開始レベル 1 に近くなっておりますが、**

41、42、43、44、45週で0.41、0.35、0.12、0.24、0.35に減少しております。長崎県は40週、41週で徐々に増加し、42週で1.03と流行開始の指標1を超えましたが、43週は0.9に減少しました。44週以降1を超えていません。(40週以降、県北(特に佐世保市)、五島で感染者数が増え、流行開始の1を超えております。)長崎は、16週(4/18-4/24)から注意報レベル(10以上)の流行が終わり、20週で流行レベルの指標1を切りました。長崎市の今シーズンの流行は20週までと報告いたしましたが、22週(5/29-6/4)で再度流行レベルに増加いたしました。23週以降は1未満となっております。2016/2017シーズンの全国的流行、長崎市、長崎県での流行は終わりましたが、長崎市、長崎県ともにインフルエンザ感染者は報告されております。長崎県が流行開始の指標1を超えたので、2017/2018シーズンに向けて、引き続き注意が必要です。

長崎市、長崎県ともに第5週(2/1-2/7)が流行のピークと考えられました。今シーズンの流行は、長崎市は23週(6/5-6/11)、長崎県は21週(5/22-5/28)で流行の終了と考えられます。

(長崎県感染症情報センターHPより抜粋、一部改変)

インフルエンザ等の感染予防のために、十分な休息、手洗い、うがい、マスクの着用等を心掛けてください。

インフルエンザが疑われる症状として、のどの痛みや鼻汁・鼻づまり、発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、全身のだるさ等がみられましたら、早めに医療機関を受診してください。

