

インフルエンザの定点当たり報告数

インフルエンザは定点把握対象疾患であり、医療機関の中から選定し、協力していただいている定点医療機関からのみ患者数が報告されます。

定点当たり報告数とは、すべての定点医療機関からの報告数を定点数で割った値のことで、言いかえると1医療機関当たりの平均報告数のことです。

厚生労働省・感染症サーベイランス事業により、全国約 5,000 のインフルエンザ定点医療機関を受診した患者数が週ごとに把握されています。長崎県のインフルエンザ定点医療機関は、長崎県内に 70 カ所、長崎市保健所管内に 17 カ所存在します。前述のように、定点当たり報告数とは、このうち1つの医療機関が1週間で何人のインフルエンザ患者を診療したか、を表す数字です。したがって、定点当たり報告数が 3 ならば、1つの医療機関で1週間に 3 人のインフルエンザ患者を診療した、ということになります。

この数字が 1 以上であれば、その地域は流行レベルに入ったことになり、10 以上なら注意報レベル、30 以上なら警報レベルの流行となります。警報が解除されるのはこの数字が「10」を切ってからです。

2016 年は、**第 46 週**（11/14 - 11/20）の定点当たり報告数が **1.38**（患者報告数 6,843 人）となり、2016/2017 年シーズンで初めて全国的な流行開始の指標である 1 を上回りました。

2017 年**第 22 週**（5/29-6/4）の全国の定点当たり報告数は **0.42**（患者報告数 2,100）で、**前週の定点当たり報告数 0.68**（10 未満）よりも**減少**し、流行レベルの指標 1 を切りました。今シーズンの流行は 20 週までということになります。国立感染症研究所の報告は、22 週（5/29-6/4）で終了となりました。**全国的には、第 4 週（1/25-1/31）が流行のピーク**と考えられました。

2017-2018 シーズンの公表が、第 45 週から開始されました。**2017 年第 47 週**（11/20-11/26）の定点当たり報告数は **1.47**（患者報告数 7,280）となり、**第 46 週**（11/13-11/19）の定点当たり報告数 **0.77** よりも増加しました。今シーズンは、**47 週で流行開始の指標 1 を超えました。**

都道府県別では沖縄県（4.88）、**長崎県（4.47）**、愛媛県（3.39）、宮崎県（3.20）、石川県（3.08）、宮城県（2.78）、新潟県（2.66）、栃木県（2.55）、福岡県（2.32）、大分県（2.24）、福井県（1.97）、東京都（1.86）、神奈川県（1.86）、広島県（1.70）、静岡県（1.65）、鹿児島県（1.61）、佐賀県（1.58）、和歌山県（1.51）の順となっていました。

国内のインフルエンザウイルスの検出状況を見ると、直近の 5 週間（2017 年第 43～47 週）では AH1pdm09 が最も多く、次いで AH3 亜型、B 型が同程度

にみられました。

詳細は国立感染症研究所ホームページ

(<http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-map.html>) を参照して下さい。

2017年は、第47週(11/20-11/26)は長崎市(1.12)、長崎県(4.47)で、第46週(11/13-11/19)の長崎市(0.53)、長崎県(3.31)より増加しております。長崎市は、47週で流行開始の指標1を超えました。長崎県は、42週で1.03と流行開始の指標1を超えましたが、43週は0.9に減少しました。44週以降1を超えています。(40週以降、県北(特に佐世保市)、五島で感染者数が増え、流行開始の指標1を超えております。佐世保市は10を超えています。)

長崎市、長崎県ともにインフルエンザの流行開始の指標1を超えましたので、引き続き注意が必要です。

(長崎県感染症情報センターHPより抜粋、1部改変)

インフルエンザ等の感染予防のために、十分な休息、手洗い、うがい、マスクの着用等を心掛けてください。

インフルエンザが疑われる症状として、のどの痛みや鼻汁・鼻づまり、発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、全身のだるさ等がみられましたら、早めに医療機関を受診してください。

