

インフルエンザ定点報告

インフルエンザは定点把握対象疾患であり、医療機関の中から選定し、協力していただいている定点医療機関からのみ患者数が報告されます。

定点当たり報告数とは、すべての定点医療機関からの報告数を定点数で割った値のことで、言いかえると1医療機関当たりの平均報告数のことです。

厚生労働省・感染症サーベイランス事業により、全国約 5,000 のインフルエンザ定点医療機関を受診した患者数が週ごとに把握されています。長崎県のインフルエンザ定点医療機関は、長崎県内に 70 カ所、長崎市保健所管内に 17 カ所存在します。前述のように、定点当たり報告数とは、このうち1つの医療機関が1週間で何人のインフルエンザ患者を診療したか、を表す数字です。したがって、定点当たり報告数が 3 ならば、1つの医療機関で1週間に 3 人のインフルエンザ患者を診療した、ということになります。

この数字が 1 以上であれば、その地域は流行レベルに入ったことになり、10 以上なら注意報レベル、30 以上なら警報レベルの流行となります。警報が解除されるのはこの数字が「10」を切ってからです。

○2018-2019 シーズンの定点報告：

2019 年第 20

週（5/13-5/19）の定点当たり報告数は 0.92（患者報告数 4,559）となり、第 19 週（5/6-5/12）の定点当たり報告数 0.74（患者報告数 3,636）より増加しました。

2018 年第 49 週の定点当たり報告数が、2018/2019 年シーズンで初めて全国的な流行開始の指標である 1.00 を上回り、その後増加しました。52 週で注意報レベルの流行、2 週以降警報レベルの流行になっていました。4 週が、全国、長崎県、長崎市ともにピークと考えられます。流行のレベルは、2-5 週が警報レベルでしたが、6 週以降注意報レベル（10 以上）となり、8 週以降流行レベルとなっておりました。19 週以降、流行レベル 1 を割りました。

都道府県別では沖縄県（4.45）、福島県（2.80）、岩手県（1.77）、山形県（1.65）、長野県（1.52）、鳥取県（1.52）、石川県（1.42）、愛知県（1.42）の順となっています。37 都道府県で前週の報告数より増加がみられましたが、10 県で前週の報告数より減少がみられました。

国内のインフルエンザウイルスの検出状況をみますと、直近の 5 週間（2019 年第 16～20 週）では B 型（56%）、AH3 亜型（38%）、AH1pdm09（6%）の順となっており、B 型の頻度が増えています。

詳細は国立感染症研究所ホームページ

(<http://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-map.html>) を参照して下さい。

なお、国立感染症研究所による 2018-2019 年シーズンのインフルエンザ流行レベルマップの公表は、第 20 週で終了となりました。

○2018-2019 シーズン 長崎市、長崎県の定点報告状況：

第 42 週（10/14-10/20）のインフルエンザ報告は、長崎市（1.59）、長崎県（0.86）で、第 41 週（10/7-10/13）長崎市（2.35）、長崎県（0.84）と比較すると、長崎市は減少、長崎県はやや増加しておりました。長崎市は、40 週、41 週、42 週と流行レベル（1 以上）となっておりませんが、41 週をピークに減少しつつあります。

2018 年、長崎市は 50 週で、長崎県は、49 週で流行開始レベルの指標 1 を超えました。その後、長崎市は、51 週で注意報レベルの流行に入りました。

2019 年、18 週以降長崎県は 1 未満となり、流行レベルではなくなりましたが、37 週、38 週で再度 1 を超えました。39 週は、1 未満となり、流行レベルではなくなりました。長崎市は、19 週で 1 未満となりましたが、20 週で再び 1 を超え、流行レベルに戻りました。その後、22 週以降 1 未満となっておりましたが、40 週で 1 を超え、流行レベルとなりました。

◎長崎県のインフルエンザ報告が、6 週より警報レベルから注意報レベルに減少し、9 週から流行レベルとなりました。長崎県が 18 週以降で、長崎市が 19 週、22 週以降で流行レベルの指標 1 を切りましたが、長崎県は 37 週で再度 1 を超えました。長崎県は、39 週、40 週と 1 未満となりましたが、長崎市が 40 週で 1 を超え、流行レベルとなりました。今後も注意が必要な状況が続いております。

（長崎県感染症情報センターHPより抜粋、1 部改変）

インフルエンザ等の感染予防のために、十分な休息、手洗い、うがい、マスクの着用等を心掛けてください。インフルエンザが疑われる症状として、のどの痛みや鼻汁・鼻づまり、発熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、全身のだるさ等がみられましたら、早めに医療機関を受診してください。